

Reduciendo el Riesgo de Uso Indebido y la Desviación



Great Lakes (HHS Region 5)

ATTC

Addiction Technology Transfer Center Network
Funded by Substance Abuse and Mental Health Services Administration

Hoja Informativa #2 sobre el Tratamiento Asistido por Medicamentos

Los procedimientos de supervisión y prescripción pueden ayudar a reducir el potencial de uso indebido o desviación del medicamento para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias. Las estrategias efectivas incluyen:

La Ley para el Tratamiento de la Adicción a Drogas de 2000 (DATA 2000)

La dispensa de DATA 2000 requiere la capacitación del prescriptor sobre el tratamiento con buprenorfina, el rastreo del uso de medicamentos prescritos a los pacientes, y pruebas regulares de detección de drogas en la orina.

DATA
2000



Consentimiento Informado del Paciente y Acuerdo de Tratamiento

Los pacientes leen y firman un consentimiento informado y un acuerdo de tratamiento que incluye ejemplos de uso indebido y desviación, y que describe la responsabilidad del paciente de tomar los medicamentos solamente según lo prescrito.

Tasas de Asistencia al Tratamiento

No presentarse a las sesiones de terapia requeridas puede indicar un uso indebido o una desviación del medicamento. Algunas organizaciones notifican a los pacientes que los medicamentos se suspenderán luego de ausencias repetidas.



Dosificación Supervisada

Los pacientes toman sus medicamentos frente al prescriptor u otro profesional médico capacitado.

Conteo de Píldoras/Hojas Solubles

- Los pacientes traen sus medicamentos prescritos para conteos no anunciados de las píldoras u hojas solubles.
- La falta de presentación del paciente podría indicar el uso indebido o la desviación del medicamento.



Pruebas Aleatorias de Orina

Algunas agencias de tratamiento hacen que todas las pruebas de orina sean observadas por un miembro del personal del mismo sexo del paciente para prevenir muestras de orina falsificadas.

Programas de Monitoreo de Medicamentos Prescritos (PMMPs)

Son programas estatales que recopilan datos sobre todas las prescripciones hechas y dispensadas. Los PMMPs pueden ayudar a los prescriptores a identificar a los pacientes que pueden estar haciendo uso indebido o desviando su medicamento. Desde noviembre de 2017, los PMMPs están operando en todos los estados, a excepción de Missouri.

PD
MP
S



Lista de Cotejo para Detectar el Uso indebido o la Desviación de los Medicamentos

Use la lista de cotejo en el reverso para guiar las discusiones con los pacientes y monitorear el posible uso indebido o desviación.

Lista de Cotejo para Reducir el Riesgo de Uso Indebido y la Desviación¹



Great Lakes (HHS Region 5)

ATTC

Addiction Technology Transfer Center Network
Funded by Substance Abuse and Mental Health Services Administration

Hoja Informativa #2 sobre el Tratamiento Asistido por Medicamentos


PRÁCTICA

EXPLICACIÓN/EJEMPLO



"Hablar"

- Defina lo que es desviación y uso indebido con cada paciente. Pídale al paciente que dé ejemplos de cada una de sus experiencias de uso de sustancias ilícitas.
- Discuta los detonantes potenciales.
- Desarrolle estrategias para combatir estos comportamientos.
- En cada visita dé seguimiento sobre si ha ocurrido alguna desviación o uso indebido, o si ha estado cerca de ocurrir, como se hace con el uso ilícito de los opioides de preferencia.
- Discútalos abiertamente durante el tratamiento.



EXAMINAR

- Las marcas recientes o que no han sanado, o una lesión nasal, puede ser un indicador de inyección de buprenorfina o uso nasal, o de que otras sustancias se están usando indebidamente, por lo que el medicamento puede venderse o cambiarse por el opioide de preferencia.
- La falta de las señales esperadas de retirada de opioides a pesar de que el paciente informa abstinencia estricta. Discútalos abiertamente durante el tratamiento.



ESCUCHAR

- Solicitudes repetidas de surtidos anticipados de medicamentos debido a varias razones: medicamentos perdidos, robados o que se lavaron con la ropa (por olvido de removerlos). Discútalos abiertamente durante el tratamiento.

MONITOREAR



- Ausencia a citas
- Conteos inexactos de tabletas/hojas solubles de medicamento.
- Pruebas de orina donde está ausente la buprenorfina y/o norbuprenorfina.
- Problemas médicos inesperados para un paciente que se entiende que está en recuperación (por ejemplo, abscesos).
- Informes estatales de monitoreo de prescripciones que muestran el recibo continuo de opioides prescritos u otras sustancias controladas que el paciente niega que le fueron prescritos, y/o prescripciones múltiples de diferentes proveedores de Tratamiento para Opioides con Base en la Oficina durante el mismo periodo.



COLABORAR

- Solicite información del farmacéutico sobre el comportamiento inusual del paciente, como aparecer intoxicado o estar acompañado por alguien que parece estar demasiado interesado en el medicamento; intercambio de algo en el estacionamiento o en el área de espera.
- El consejero y los familiares que no consumen sustancias actualmente, y que tienen en consideración el mejor interés del paciente, informan el contacto del paciente con viejos amigos que consumen, o la falta de adherencia del paciente al medicamento si están supervisando la ingesta.

enero 2018

attnetwork.org/greatlakes | niatx.net



¹Lofwall, M.R., & Walsh, S.L. (2014). A review of buprenorphine diversion and misuse: the current evidence base and experiences from around the world. *Journal of Addiction Medicine*, 8 (5), 315-326.